

# QUIK TANK

**Mark E II**

**#2308886**

**Disinfectant, Cleaner, Mildewstat, Non-Food  
Contact Sanitizer, Virucide\*, and Deodorizer**

EPA Reg. No. 10324-108-3640  
EPA Est. No. 3640-WI-1

## FIRST AID

In case of emergency, call a poison control center or doctor for treatment advice. Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment.

**IF IN EYES:** Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye.

**IF ON SKIN:** Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes.

**IF SWALLOWED:** Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control center or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person. Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice.

**IF INHALED:** Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably mouth-to-mouth, if possible.

**NOTE TO PHYSICIAN:** Probable mucosal damage may contraindicate the use of gastric lavage.

## DIRECTIONS



Mix contents of one 2.5-ounce (73.9 mL) pack with water in the 5-gallon Quik Tank container to make 5 gallons (19 L) of ready-to-use Mark E II. Agitate to mix. This unit is intended to contain a ready-to-use disinfectant or sanitizing solution, which may not be diluted further. Fill trigger spray bottle with solution from the 5-gallon (19 L) Quik Tank. Spray 6-8 inches from surface and rub with brush, sponge, or cloth. Treated surfaces must remain wet for 10 minutes. Allow to air dry. Empty and rinse bottle before refilling.



# QUIK TANK

**Mark E II**

**#2308886**

**Disinfectant, Cleaner, Mildewstat, Non-Food  
Contact Sanitizer, Virucide\*, and Deodorizer**

EPA Reg. No. 10324-108-3640  
EPA Est. No. 3640-WI-1

## FIRST AID

In case of emergency, call a poison control center or doctor for treatment advice. Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment.

**IF IN EYES:** Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye.



**IF ON SKIN:** Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes.

**IF SWALLOWED:** Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control center or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person. Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice.

**IF INHALED:** Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably mouth-to-mouth, if possible.

**NOTE TO PHYSICIAN:** Probable mucosal damage may contraindicate the use of gastric lavage.

## DIRECTIONS



Mix contents of one 2.5-ounce (73.9 mL) pack with water in the 5-gallon Quik Tank container to make 5 gallons (19 L) of ready-to-use Mark E II. Agitate to mix. This unit is intended to contain a ready-to-use disinfectant or sanitizing solution, which may not be diluted further. Fill trigger spray bottle with solution from the 5-gallon (19 L) Quik Tank. Spray 6-8 inches from surface and rub with brush, sponge, or cloth. Treated surfaces must remain wet for 10 minutes. Allow to air dry. Empty and rinse bottle before refilling.



**STEARNS PACKAGING CORPORATION**  
P.O. Box 3216, 4200 Sycamore Avenue, Madison, Wisconsin 53704  
1-800-655-5008 • www.stearnspkg.com

Rev. 1217



**STEARNS PACKAGING CORPORATION**  
P.O. Box 3216, 4200 Sycamore Avenue, Madison, Wisconsin 53704  
1-800-655-5008 • www.stearnspkg.com

Rev. 1217

# QUIK TANK

**Mark E II**

**#2308886**

**Desinfectante, más Limpio, Mildewstat,  
No Alimenticio Póngase en Contacto con Sanitizer,  
Virucide \* y Desodorizer**

EPA Reg. No. 10324-108-3640  
EPA Est. No. 3640-WI-1



## PRIMEROS AUXILIOS

En caso de emergencia, llame a un centro de control de envenenamientos o al médico para recibir asesoramiento sobre el tratamiento. Tenga el contenedor o la etiqueta del producto con usted cuando llame a un centro de control de envenenamientos o al médico, o vaya a recibir tratamiento.

**EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Mantenga los ojos abiertos y enjuague suave y lentamente con agua durante 15-20 minutos. Retire las lentes de contacto, si están presentes, después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando los ojos.


**EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Qútese la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con abundante agua durante 15-20 minutos.

**SI SE INGIERE:** Pida a la persona que sorbe un vaso de agua si puede tragar. No induzca el vómito a menos que así lo indique un centro de control de envenenamientos o un médico. No le dé nada por la boca a una persona inconsciente. Llame a un centro de control de envenenamientos o al médico de inmediato para recibir asesoramiento sobre el tratamiento.

**SI SE INHALA:** Mueva a la persona al aire fresco. Si la persona no respira, llame al 911 o una ambulancia, luego déle respiración artificial, preferiblemente de boca a boca, si es posible.

**NOTA PARA EL MÉDICO:** El daño probable de la mucosa puede contraindicar el uso del lavado gástrico.

## INTRUCCIONES



Mezcle el contenido de un paquete de 2.5 oz. (73.9 mL) con agua en el recipiente Quik Tank de 5 galones (19 L) para de Mark E II listos para usar. Agite para mezclar. Esta unidad está destinada a contener un desinfectante o solución desinfectante lista para usar, que no se puede diluir aún más. Rellene la botella de rociado de disparo con solución del tanque Quik de 5 galones (19 L). Rocíe 6-8 pulgadas de la superficie y frote con un cepillo, esponja o paño. Las superficies tratadas deben permanecer durante 10 minutos. Deje que se seque al aire. Vacíe y enjuague la botella antes de volver a llenarla.

# QUIK TANK

**Mark E II**

**#2308886**

**Desinfectante, más Limpio, Mildewstat,  
No Alimenticio Póngase en Contacto con Sanitizer,  
Virucide \* y Desodorizer**

EPA Reg. No. 10324-108-3640  
EPA Est. No. 3640-WI-1



## PRIMEROS AUXILIOS

En caso de emergencia, llame a un centro de control de envenenamientos o al médico para recibir asesoramiento sobre el tratamiento. Tenga el contenedor o la etiqueta del producto con usted cuando llame a un centro de control de envenenamientos o al médico, o vaya a recibir tratamiento.

**EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Mantenga los ojos abiertos y enjuague suave y lentamente con agua durante 15-20 minutos. Retire las lentes de contacto, si están presentes, después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando los ojos.



**EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Qútese la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con abundante agua durante 15-20 minutos.

**SI SE INGIERE:** Pida a la persona que sorbe un vaso de agua si puede tragar. No induzca el vómito a menos que así lo indique un centro de control de envenenamientos o un médico. No le dé nada por la boca a una persona inconsciente. Llame a un centro de control de envenenamientos o al médico de inmediato para recibir asesoramiento sobre el tratamiento.

**SI SE INHALA:** Mueva a la persona al aire fresco. Si la persona no respira, llame al 911 o una ambulancia, luego déle respiración artificial, preferiblemente de boca a boca, si es posible.

**NOTA PARA EL MÉDICO:** El daño probable de la mucosa puede contraindicar el uso del lavado gástrico.

## INTRUCCIONES



Mezcle el contenido de un paquete de 2.5 oz. (73.9 mL) con agua en el recipiente Quik Tank de 5 galones (19 L) para de Mark E II listos para usar. Agite para mezclar. Esta unidad está destinada a contener un desinfectante o solución desinfectante lista para usar, que no se puede diluir aún más. Rellene la botella de rociado de disparo con solución del tanque Quik de 5 galones (19 L). Rocíe 6-8 pulgadas de la superficie y frote con un cepillo, esponja o paño. Las superficies tratadas deben permanecer durante 10 minutos. Deje que se seque al aire. Vacíe y enjuague la botella antes de volver a llenarla.



**STEARNS PACKAGING CORPORATION**  
P.O. Box 3216, 4200 Sycamore Avenue, Madison, Wisconsin 53704  
1-800-655-5008 • www.stearnspkg.com

Rev. 1217



**STEARNS PACKAGING CORPORATION**  
P.O. Box 3216, 4200 Sycamore Avenue, Madison, Wisconsin 53704  
1-800-655-5008 • www.stearnspkg.com

Rev. 1217